

PSIQUIATRÍA LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD DE LOS PADRES PUEDEN AFECTAR A LOS HIJOS

Un estudio internacional evalúa el riesgo de suicidio según los problemas mentales de los progenitores

Redacción

Un estudio internacional ha tenido como objetivo determinar qué trastornos mentales de los padres se asocian con el suicidio de los hijos, y cuáles de esos trastornos parentales pueden ser más importantes en el paso de la idea del suicidio de los hijos a su planificación o intento. El trabajo ha comprobado que todos los trastornos mentales de los padres se asocian con una mayor tendencia a la ideación suicida de los hijos, pero sólo la ansiedad generalizada y la depresión se relacionan con la elaboración de planes de suicidio y con la persistencia en el tiempo de

la ideación suicida, mientras que la personalidad antisocial y los trastornos de ansiedad de los padres se asocian con los intentos de suicidio de los hijos y con su persistencia en el tiempo.

"Es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental, y tener en cuenta que el riesgo aumenta con cada trastorno adicional que sufran los padres", ha explicado Jordi Alonso, coinvestigador principal del equipo español, director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del Instituto de Investigación Hospital del

Mar (IMIM), de Barcelona, y coordinador científico europeo del estudio mundial *World Mental Health surveys*.

Parámetros estudiados

El trabajo se ha desarrollado en el marco del *World Mental Health (WMH)*, según sus siglas inglesas en 21 países de los cinco continentes, con una muestra de 109.381 individuos que han sido entrevistados por personal entrenado para tal efecto. El estudio ha considerado muchos datos sobre la salud de los individuos entrevistados, como, por ejemplo, sus propios trastornos mentales y sus diagnósticos de patologías físicas, lo que ha permiti-

do una estimación más válida de las asociaciones que se han analizado.

El suicidio es un gran problema de salud pública, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, es la segunda causa de muerte en adolescentes en el mundo occidental. Pero hay que tener en cuenta que el suicidio es en parte evitable. La identificación precoz y el tratamiento adecuado de los trastornos mentales deberían ser una estrategia preventiva muy importante.

Los resultados de este trabajo pueden ser relevantes para guiar a los futuros estudios que se lleven a cabo so-



Jordi Alonso, del Instituto de Investigación Hospital del Mar.

bre las bases genéticas del suicidio, incidiendo en los fenotipos psicopatológicos que tienen una mayor asociación con las diferentes fases del suicidio.

"En el caso del intento y de la realización del suicidio, habría que estudiar la posible base genética co-

mún entre la falta del control de los impulsos y el suicidio, centrándonos menos en los trastornos mentales concretos y analizando los rasgos subyacentes en tales trastornos", ha concluido Jordi Alonso.

■ (*Molecular Psychiatry* 2011; 16: 1221-33).



Pares angoixats o deprimits poden tenir fills més propensos al suïcidi

► Altres trastorns mentals paternals creen la tendència, però només aquests porten a planificar la pròpia mort

EFE | BARCELONA

■ Els fills de pares que pateixen ansietat o depressió tenen una major tendència al suïcidi, segons ha constatat un estudi internacional elaborat amb una mostra de 109.381 persones de 21 països i que ha coordinat a Europa l'Institut d'Investigació (IMIM) de l'Hospital del Mar de Barcelona.

L'estudi ha tingut com a objectiu determinar quins trastorns mentals dels pares s'associen amb el suïcidi dels fills, i quins d'aquests trastorns parentals poden ser més importants en el pas de la idea del suïcidi dels fills a la seva planificació o intent.

El director del Programa d'Epidemiologia i Salut Pública de l'IMIM i coordinador científic europeu de l'estudi mundial World Mental Health Surveys, Jordi Alonso, ha explicat que «és fonamental considerar el possible risc de conductes suïcides en les famílies en les quals els pares pateixen algun trastorn mental, i tenir en compte que el risc augmenta amb cada trastorn addicional que pateixin els pares». L'estudi, segons ha informat l'IMIM, ha constatat que tots els trastorns mentals dels pares s'associen a una major tendència a la ideació suïcida dels fills, però només l'ansietat generalitzada i la depressió s'associen amb l'elaboració de plans de suïcidi i amb la persistència en el temps de la ideació suïcida.



Los hijos de padres con depresión son más propensos al suicidio

Quitarse la vida es la segunda causa de muerte de los adolescentes en el mundo

Agencias / BARCELONA

Los hijos de padres que sufren ansiedad o depresión tienen una mayor tendencia al suicidio, según un estudio internacional elaborado con una muestra de 109.381 personas en 21 países y que ha coordinado en Europa el Instituto de Investigación (IMIM) del Hospital del Mar de Barcelona.

El director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM y coordinador científico europeo del estudio, Jordi Alonso, explicó que “es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental”.

El estudio constata que todos los trastornos mentales de los padres se asocian a una mayor tendencia a la idea del suicidio en los hijos, pero sólo la ansiedad generalizada y la depresión se asocian con la elaboración de planes de suicidio.

Según el IMIM, el suicidio es un gran problema de salud pública que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, es la segunda causa de muerte en adolescentes en el mundo.



Los hijos de padres con depresión son más propensos al suicidio

Quitarse la vida es la segunda causa de muerte de los adolescentes en el mundo

Agencias / BARCELONA

Los hijos de padres que sufren ansiedad o depresión tienen una mayor tendencia al suicidio, según un estudio internacional elaborado con una muestra de 109.381 personas en 21 países y que ha coordinado en Europa el Instituto de Investigación (IMIM) del Hospital del Mar de Barcelona.

El director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM y coordinador científico europeo del estudio, Jordi Alonso, explicó que "es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental".

El estudio constata que todos los trastornos mentales de los padres se asocian a una mayor tendencia a la idea del suicidio en los hijos, pero sólo la ansiedad generalizada y la depresión se asocian con la elaboración de planes de suicidio.

Según el IMIM, el suicidio es un gran problema de salud pública que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, es la segunda causa de muerte en adolescentes en el mundo.



Los hijos de padres con depresión son más propensos al suicidio

Quitarse la vida es la segunda causa de muerte de los adolescentes en el mundo

Agencias / BARCELONA

Los hijos de padres que sufren ansiedad o depresión tienen una mayor tendencia al suicidio, según un estudio internacional elaborado con una muestra de 109.381 personas en 21 países y que ha coordinado en Europa el Instituto de Investigación (IMIM) del Hospital del Mar de Barcelona.

El director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM y coordinador científico europeo del estudio, Jordi Alonso, explicó que “es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental”.

El estudio constata que todos los trastornos mentales de los padres se asocian a una mayor tendencia a la idea del suicidio en los hijos, pero sólo la ansiedad generalizada y la depresión se asocian con la elaboración de planes de suicidio.

Según el IMIM, el suicidio es un gran problema de salud pública que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, es la segunda causa de muerte en adolescentes en el mundo.



Los hijos de padres con depresión son más propensos al suicidio

Quitarse la vida es la segunda causa de muerte de los adolescentes en el mundo

Agencias / BARCELONA

Los hijos de padres que sufren ansiedad o depresión tienen una mayor tendencia al suicidio, según un estudio internacional elaborado con una muestra de 109.381 personas en 21 países y que ha coordinado en Europa el Instituto de Investigación (IMIM) del Hospital del Mar de Barcelona.

El director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM y coordinador científico europeo del estudio, Jordi Alonso, explicó que “es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental”.

El estudio constata que todos los trastornos mentales de los padres se asocian a una mayor tendencia a la idea del suicidio en los hijos, pero sólo la ansiedad generalizada y la depresión se asocian con la elaboración de planes de suicidio.

Según el IMIM, el suicidio es un gran problema de salud pública que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, es la segunda causa de muerte en adolescentes en el mundo.



Los hijos de depresivos sufren más riesgo de suicidio

C. REINO | BARCELONA

■ Los hijos cuyos padres sufren ansiedad o depresión tienen más posibilidades de quitarse la vida en un suicidio. Lo afirma un estudio internacional, realizado en 21 países, y que en Europa lo ha coordinado el Instituto de Investigación (IMIM) del hospital del Mar de Barcelona.

«Es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental y tener en cuenta que el riesgo aumenta con cada trastorno adicional que padecen los padres», aseguró el director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM, Jordi Alonso. El estudio ha tenido como objetivo determinar qué trastornos mentales de los padres tienen relación con el suicidio de los hijos y cuáles pueden ser más decisivos en el paso de la idea de los jóvenes de matarse a su planificación o intento.



Los hijos de padres con depresión son más propensos al suicidio

Quitarse la vida es la segunda causa de muerte de los adolescentes en el mundo

Agencias / BARCELONA

Los hijos de padres que sufren ansiedad o depresión tienen una mayor tendencia al suicidio, según un estudio internacional elaborado con una muestra de 109.381 personas en 21 países y que ha coordinado en Europa el Instituto de Investigación (IMIM) del Hospital del Mar de Barcelona.

El director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM y coordinador científico europeo del estudio, Jordi Alonso, explicó que “es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental”.

El estudio constata que todos los trastornos mentales de los padres se asocian a una mayor tendencia a la idea del suicidio en los hijos, pero sólo la ansiedad generalizada y la depresión se asocian con la elaboración de planes de suicidio.

Según el IMIM, el suicidio es un gran problema de salud pública que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, es la segunda causa de muerte en adolescentes en el mundo.



Los hijos de padres con depresión tienen más riesgo de suicidio

Los hijos de padres que sufren ansiedad o depresión tienen una mayor tendencia al suicidio, constató un estudio internacional elaborado con una muestra de 109.381 personas en 21 países y que ha coordinado en Europa el Instituto de Investigación del hospital del Mar de Barcelona. El estudio constató que todos los trastornos mentales de los padres se asocian a una mayor tendencia a la ideación suicida de los hijos.



Los hijos de padres con depresión son más propensos al suicidio

Quitarse la vida es la segunda causa de muerte de los adolescentes en el mundo

Agencias / BARCELONA

Los hijos de padres que sufren ansiedad o depresión tienen una mayor tendencia al suicidio, según un estudio internacional elaborado con una muestra de 109.381 personas en 21 países y que ha coordinado en Europa el Instituto de Investigación (IMIM) del Hospital del Mar de Barcelona.

El director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM y coordinador científico europeo del estudio, Jordi Alonso, explicó que “es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental”.

El estudio constata que todos los trastornos mentales de los padres se asocian a una mayor tendencia a la idea del suicidio en los hijos, pero sólo la ansiedad generalizada y la depresión se asocian con la elaboración de planes de suicidio.

Según el IMIM, el suicidio es un gran problema de salud pública que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, es la segunda causa de muerte en adolescentes en el mundo.



Los hijos de padres con depresión tienen más riesgo de suicidio

└ Los hijos de padres que sufren ansiedad o depresión tienen una mayor tendencia al suicidio, constató un estudio internacional elaborado con una muestra de 109.381 personas en 21 países y que ha coordinado en Europa el Instituto de Investigación del hospital del Mar de Barcelona. El estudio constató que todos los trastornos mentales de los padres se asocian a una mayor tendencia a la ideación suicida de los hijos.



Los hijos de padres con depresión son más propensos al suicidio

Quitarse la vida es la segunda causa de muerte de los adolescentes en el mundo

Agencias / BARCELONA

Los hijos de padres que sufren ansiedad o depresión tienen una mayor tendencia al suicidio, según un estudio internacional elaborado con una muestra de 109.381 personas en 21 países y que ha coordinado en Europa el Instituto de Investigación (IMIM) del Hospital del Mar de Barcelona.

El director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM y coordinador científico europeo del estudio, Jordi Alonso, explicó que “es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental”.

El estudio constata que todos los trastornos mentales de los padres se asocian a una mayor tendencia a la idea del suicidio en los hijos, pero sólo la ansiedad generalizada y la depresión se asocian con la elaboración de planes de suicidio.

Según el IMIM, el suicidio es un gran problema de salud pública que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, es la segunda causa de muerte en adolescentes en el mundo.



Los hijos de padres con ansiedad o depresión tienen más riesgo de cometer suicidio

- Los hijos cuyos padres padecen trastornos mentales como ansiedad o depresión tienen más riesgo de suicidio, según un estudio realizado en 21 países en el que ha participado el Hospital del Mar de Barcelona. La ansiedad generalizada y la depresión se relacionan con la elaboración de planes de suicidio, mientras que la personalidad antisocial y los trastornos de ansiedad de los progenitores se asocian con la realización de intentos de suicidio de los adolescentes, refleja la investigación.



Los hijos de padres con depresión tienen más riesgo de suicidio

└ Los hijos de padres que sufren ansiedad o depresión tienen una mayor tendencia al suicidio, constató un estudio internacional elaborado con una muestra de 109.381 personas en 21 países y que ha coordinado en Europa el Instituto de Investigación del hospital del Mar de Barcelona. El estudio constató que todos los trastornos mentales de los padres se asocian a una mayor tendencia a la ideación suicida de los hijos.



Los hijos de padres con depresión tienen más riesgo de suicidio

Efe

MADRID

Los hijos de padres con ansiedad o depresión tienen una mayor tendencia al suicidio, según constata un estudio internacional elaborado con una muestra de 109.381 personas en 21 países y coordinado en Europa el Instituto de Investigación (IMIM) del Hospital del Mar de Barcelona.

El estudio ha tenido como objetivo determinar qué trastornos mentales de los padres se asocian con el suicidio de los hijos, y cuáles de estos trastornos parentales pueden ser más importantes en el paso de la idea del suicidio de los hijos.

El director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM, Jordi Alonso, ha explicado que “es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en esas familias”.



CHANCE LATAM EPSOCIAL MOTOR TURISMO PORTALTIC .CAT ABONADOS

europapress.es últimas noticias

Viernes, 17 de febrero 2012

canal agroandaluz

Buscar... Buscar

Lenguas

NACIONAL INTERNACIONAL ECONOMÍA DEPORTES TV CULTURA SOCIEDAD SALUD COMUNICADOS INNOVA VÍDEOS FOTOS SERVICIOS

CATALUÑA Barcelona Girona Lleida Tarragona [twitter @epcatalunya](#)

europapress.cat Occitan Fira de Barcelona Canal Agro

DESTACADAS

- El Gobierno baja hasta un 30% los sueldos de directivos de empresas públicas
- El cambio
- Cospedal no tiene constancia de "presiones" contra su acumulación de poder
- Santamaría defiende que ex ministros mantengan parte del sueldo dos años
- El CSN no ve impedimento para modificar el cierre de Garoña en 2013

INVESTIGACIÓN MUNDIAL

Los hijos de padres con ansiedad o depresión tienen más riesgo de suicidio, según un estudio

Cataluña ofrecido por

¿y tú?

Directorio Instituto Investigación Hospital Mar Programa Epidemiología Salud Pública Imim Barcelona Jordi Alonso

Deja tu comentario


Imprimir Enviar

COMPARTE ESTA NOTICIA

tweet enviar

meaneat tuenti

0



BARCELONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los hijos cuyos padres padecen trastornos mentales como ansiedad o depresión tienen más riesgo de suicidio, según ha revelado un estudio internacional realizado en 21 países en el que ha participado el Instituto de Investigación del Hospital del Mar (Imim) de Barcelona.

Elaborado con una muestra de 109.381 personas de los cinco continentes, el estudio ha

constatado que los trastornos mentales de los padres se asocian a "una mayor tendencia a la ideación suicida de sus hijos".

Concretamente, la ansiedad generalizada y la depresión se relacionan con la elaboración de planes de suicidio, mientras que la personalidad antisocial y los trastornos de ansiedad de los progenitores se asocian con la realización de intentos de suicidio de los adolescentes.


"Es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental", ha asegurado el miembro del equipo de investigación español y director del Programa de Epidemiología y Salud Pública Imim, Jordi Alonso, en un comunicado.

Aunque afecta mayoritariamente a personas adultas, el suicidio es la segunda causa de muerte en adolescentes, por lo que Alonso ha destacado la importancia de la prevención para conseguir acabar con este tipo de muerte "evitable".

"Seguiremos estudiando la posible base genética común entre la falta de control de los impulsos y el suicidio", ha añadido Alonso, que ha resaltado que los resultados de esta investigación pueden ser relevantes para guiar otros estudios del mismo ámbito.

[Adelgazar con Lipo-XR](#)
 Descubra la pastilla para perder peso que España ha estado esperando
[Lipo-XR.es](#)

VÍDEOS DESTACADOS



Más Leídas Más Noticias

1. Zoido dice que la manifestación contra la reforma "no empañará" el congreso del PP, "con tranquilidad interna"
2. Lin acompañará a Ricky Rubio en el 'Rising

ola de frío

[Pregunta al hombre del tiempo en ABC.es cómo hará en tu ciudad el fin de semana](#)

Noticias agencias

Los hijos de padres con ansiedad o depresión tienen más riesgo de suicidio

16-02-2012 / 12:10 h EFE

Los hijos de padres que sufren ansiedad o depresión tienen una mayor tendencia al suicidio, según ha constatado un estudio internacional elaborado con una muestra de 109.381 personas en 21 países y que ha coordinado en Europa el Instituto de Investigación (IMIM) del Hospital del Mar de Barcelona.

El estudio ha tenido como objetivo determinar qué trastornos mentales de los padres se asocian con el suicidio de los hijos, y cuáles de estos trastornos parentales pueden ser más importantes en el paso de la idea del suicidio de los hijos a su planificación o intento.

El director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM y coordinador científico europeo del estudio mundial World Mental Health Surveys, Jordi Alonso, ha explicado que "es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental, y tener en cuenta que el riesgo aumenta con cada trastorno adicional que sufran los padres".

El estudio, según ha informado el IMIM, ha constatado que todos los trastornos mentales de los padres se asocian a una mayor tendencia a la ideación suicida de los hijos, pero sólo la ansiedad generalizada y la depresión se asocian con la elaboración de planes de suicidio y con la persistencia en el tiempo de la ideación suicida.

Por su parte, la personalidad antisocial y los trastornos de ansiedad de los padres se asocian con la realización de intentos de suicidio de los hijos.

El estudio se ha desarrollado en el marco del World Mental Health (WMH) en 21 países de todo el mundo con una muestra de 109.381 personas que se han entrevistado personalmente y a las que se les ha requerido datos sobre su salud, como sus propios trastornos mentales y sus diagnósticos de patologías físicas, lo que, según el IMIM, ha permitido "una estimación más válida" de las asociaciones que se han estudiado.

Según el IMIM, el suicidio es un gran problema de salud pública que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, es la segunda causa de muerte en adolescentes en el mundo occidental.

Los especialistas que han participado en el estudio han destacado que "el suicidio es en parte evitable", por lo que "la identificación precoz y el tratamiento adecuado de los trastornos mentales son una estrategia preventiva muy importante".

Según el doctor Alonso, los resultados de este trabajo pueden ser relevantes para guiar los futuros estudios que se lleven a cabo sobre las bases genéticas del suicidio, "incidiendo en los fenotipos psicopatológicos que tienen una mayor asociación con las diferentes fases del suicidio".

"En el caso del intento y la realización del suicidio, habría que estudiar la posible base genética común entre la falta del control de los impulsos y el suicidio, centrándonos menos en los trastornos mentales concretos y analizando los rasgos subyacentes en estos trastornos", ha manifestado Jordi Alonso.

Noticias relacionadas

- Los castigos corporales aumentan la agresividad de los niños

El estudio también indica que el castigo físico está asociado con problemas mentales como **depresión**, **ansiedad** y el consumo de drogas y alcohol.

- Seis años de cárcel para una madre que quemó a sus hijos con la vitrocerámica por no haber hecho los deberes

Por estos hechos también se ha juzgado hoy al **padre** de uno de los **hijos** de la mujer, en concreto de la niña, actual pareja de la mujer y que ha sido condenado, por conformidad, a 56 ...

- Tres consejos para la educación


Los **padres** no podemos pretender que nuestros **hijos** hagan cosas que nosotros no practicamos. Los **padres** tenemos una gran responsabilidad en la educación de nuestros ...

- José Bretón ocultó diez años a su mujer su intento de suicidio

El suicidio es la segunda causa de muerte en adolescentes en el mundo occidental

Los hijos de padres con ansiedad o depresión tienen más riesgo de suicidio

Según ha constatado un estudio internacional, el riesgo de conductas suicidas en los jóvenes se ve agravado con cada trastorno adicional que sufran los padres.

 Compartir

0

 menéalo

Twitter 0

Me gusta




Los hijos de padres con ansiedad o depresión tienen más riesgo de suicidio (Agencia: Europa Press)

Según el IMIM, el suicidio es un gran problema de salud pública y la segunda causa de muerte en adolescentes en el mundo occidental

Los resultados de este trabajo pueden ser relevantes para guiar los futuros estudios que se lleven a cabo sobre las bases genéticas del suicidio

Jordi Alonso.

 Compartir

0

 menéalo

Twitter 0

Me gusta

Los hijos de padres que sufren **ansiedad o depresión** tienen una **mayor tendencia al suicidio**, según ha constatado un estudio internacional elaborado con una muestra de 109.381 personas en 21 países y que ha coordinado en Europa el Institut Municipal d'Investigació Mèdica (**IMIM**) del **Hospital del Mar** de Barcelona.

El estudio ha tenido como objetivo determinar qué trastornos **mentales de los padres** se asocian con el suicidio de los hijos, y cuáles de estos trastornos parentales pueden ser más importantes en el paso de la idea del suicidio de los hijos a su planificación o intento.

El director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM y coordinador científico europeo del estudio mundial World Mental Health Surveys, Jordi Alonso, ha explicado que "es fundamental considerar el **posible riesgo de conductas suicidas** en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental, y tener en cuenta que el riesgo **aumenta con cada trastorno adicional que sufran los padres**".

Las personas participantes han sido entrevistadas personalmente y se les ha requerido datos sobre su salud, como sus propios **trastornos mentales** y sus **diagnósticos de patologías físicas**, lo que, según el IMIM, ha permitido "una estimación más válida" de las asociaciones que se han estudiado.

Según el IMIM, el suicidio es un **gran problema de salud pública** que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, es la **segunda causa de muerte en adolescentes** en el mundo occidental.

Los especialistas que han participado en el estudio han destacado que "el suicidio es en parte evitable", por lo que "la **identificación precoz** y el **tratamiento adecuado de los trastornos mentales** son una estrategia preventiva muy importante".

Según el doctor Alonso, los resultados de este trabajo pueden ser relevantes para guiar los futuros estudios que se lleven a cabo sobre las **bases genéticas del suicidio**, "incidiendo en los **fenotipos psicopatológicos** que tienen una mayor asociación con las diferentes **fases del suicidio**".

"En el caso del **intento y la realización del suicidio**, habría que estudiar la posible base genética común entre la falta del control de los impulsos y el suicidio, centrándonos menos en los trastornos mentales concretos y analizando los **rasgos subyacentes en estos trastornos**", ha manifestado

Salud

noticias, artículos ...

Portada	España	Mundo	Política	Dinero	Deportes	El Tiempo	Salud	Sucesos	Tierra	Ciencia	Educa	Empleo	Motor	Tecno	Ocio
Gente	Tele	Música	Cine	Cultura	Increible	Moda	Belleza	Players	Familia	Religión	Local	Y Además			

Los hijos de padres con ansiedad o depresión tienen más riesgo de suicidio

Hace 5 horas - EUROPA PRESS, BARCELONA

Los hijos cuyos padres padecen trastornos mentales como ansiedad o depresión tienen más riesgo de suicidio, según ha revelado un estudio internacional realizado en 21 países en el que ha participado el Instituto de Investigación del Hospital del Mar (Imim) de Barcelona.

Me gusta 0

ÚLTIMA HORA

[Las enfermedades de los niños adoptados son "fácilmente tratables" y no dejan ningún tipo de secuela](#)

[Pfizer modifica el embalaje de 'Viagra' para diferenciar los comprimidos originales de los falsos](#)

[Médicos de Atención Primaria dicen que "no se quedarán de brazos cruzados" si hay más recortes](#)

[Ángel, tras el trasplante afirma que cuando lo vió quedó alucinado, "por fin tengo ya mano"](#)

Elaborado con una muestra de 109.381 personas de los cinco continentes, el estudio ha constatado que los trastornos mentales de los padres se asocian a "una mayor tendencia a la ideación suicida de sus hijos".

Concretamente, la ansiedad generalizada y la depresión se relacionan con la elaboración de planes de suicidio, mientras que la personalidad antisocial y los trastornos de ansiedad de los progenitores se asocian con la realización de intentos de suicidio de los adolescentes.

"Es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental", ha asegurado el miembro del equipo de investigación español y director del Programa de Epidemiología y Salud Pública Imim, Jordi Alonso, en un comunicado.

Aunque afecta mayoritariamente a personas adultas, el suicidio es la segunda causa de muerte en adolescentes, por lo que Alonso ha destacado la importancia de la prevención para conseguir acabar con este tipo de muerte "evitable".

"Seguiremos estudiando la posible base genética común entre la falta de control de los impulsos y el suicidio", ha añadido Alonso, que ha resaltado que los resultados de esta investigación pueden ser relevantes para guiar otros estudios del mismo ámbito.

Me gusta 0

OTRAS NOTICIAS

[Los hijos de padres con ansiedad o depresión tienen más riesgo de suicidio](#)

[HM Hospitales asegura que la operación de nariz que provocó la muerte de un paciente "no está exenta de riesgos"](#)

[Aumentan las consultas jurídicas por motivos laborales de las personas con VIH/sida](#)

[Tomar vitamina D durante el embarazo ayuda a reducir los problemas en el lenguaje de los hijos](#)

0 COMENTARIOS

DEJA TU COMENTARIO

Comenta *

Nombre de usuario *

Email *

* Campos obligatorios

He leído y acepto las [normas de uso](#)



SALUD

Los hijos de padres depresivos tienen más riesgo de suicidio

Es la segunda causa de muerte entre los adolescentes en el mundo occidental

16.02.12 - 19:54 - CRISTIAN REINO | BARCELONA

Los hijos cuyos padres sufren ansiedad o depresión tienen más posibilidades de quitarse la vida en un suicidio. Lo afirma un estudio internacional, realizado en 21 países, y que en Europa lo ha coordinado el Instituto de Investigación (IMIM) del hospital del Mar de Barcelona. "Es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental y tener en cuenta que el riesgo aumenta con cada trastorno adicional que padecen los padres", asegura el director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM, Jordi Alonso.

El estudio ha tenido como objetivo determinar qué trastornos mentales de los padres tienen relación con el suicidio de los hijos y cuáles pueden ser más decisivos en el paso de la idea de los jóvenes de matarse a su planificación o intento. Así, según concluye la investigación, "todos los trastornos mentales de los padres tienen que ver con una mayor tendencia a la ideación suicida de los hijos". Pero "sólo la ansiedad generalizada y la depresión se asocian con la elaboración de planes" de los hijos para acabar con su vida. Mientras que la personalidad antisocial de los progenitores influye en la realización de intentos de suicidio de los hijos y con su persistencia en el tiempo.

El trabajo, desarrollado en el marco del World Mental Health, constata que el suicidio es un gran problema de salud pública que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, supone la segunda causa de muerte entre los adolescentes en el mundo occidental. En España, donde desde hace un año el suicidio ha superado a los accidentes de tráfico como segunda causa de muerte (siempre por detrás de las razones naturales), se han disparado las cifras: el número de españoles que se quita la vida ha crecido en un 31% en sólo 10 años.

Aun así, los autores del informe creen que, en parte, es evitable. "La identificación precoz y el tratamiento adecuado de los trastornos mentales son una estrategia preventiva muy importante", señalan. Por ello, los resultados de este trabajo pueden ser relevantes para guiar a los futuros estudios que se lleven a cabo sobre las bases genéticas del suicidio. "Seguiremos estudiando la posible base genética común entre la falta de control de los impulsos y el suicidio", según Alonso.

TAGS RELACIONADOS

[hijos, padres, depresivos](#)

ANUNCIOS GOOGLE

Adelgazar con Lipo-XR

Descubre la pastilla para perder peso que España ha estado esperando
[Lipo-XR.es](#)

Núria Tortós - Psicòloga

Psicoteràpia individual i familiar. Maresme i La Selva
[www.nuriatortos.com](#)

Psicòloga online: Isabel

Te ofrezco mi ayuda a través de mail, chat, tlf y videoconferencia
[www.e-psicologa.com](#)

Dr. Sanmarti

Médico, psicólogo y homeopata Ansiedad, depresión, pareja, etc
[www.medinatur.com](#)

DISQUS

SUR.es

© Diario SUR Digital, S. L.
ISSN 2173-0261. Registro Mercantil de Málaga, Tomo 1626, Libro 539, Folio 13, Sección 8, Hoja 19333, Inscripción 1ª C.I.F.: B48583579 Domicilio social en Málaga, Av. Dr. Marañón, 48 Correo electrónico de contacto surdigital@diariosur.es Copyright © DIARIO SUR DIGITAL, S.L. - Málaga. Incluye contenidos de la empresa citada, del medio SUR – El periódico de Málaga y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:

Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.

[Contactar](#) | [Staff](#) | [Mapa Web](#) | [Aviso legal](#) | [Política de privacidad](#) | [Publicidad](#)

ENLACES VOCENTO

[ABC.es](#)
[El Correo](#)
[elnortedecastilla.es](#)
[Elcomercio.es](#)
[SUR.es](#)
[Qué.es](#)
[La Voz Digital](#)
[ABC Punto Radio](#)
[hoyCinema](#)
[Infoempleo](#)
[Autocasion](#)

[Hoy Digital](#)
[La Rioja.com](#)
[DiarioVasco.com](#)
[Ideal digital](#)
[Las Provincias](#)
[El Diario Montañés](#)
[Laverdad.es](#)
[Finanzas y planes de hoyMotor](#)
[hoyMotor](#)
[Guía TV](#)
[11870.com](#)



Arrastra a la barra de windows para acceder a opciones especiales en IE9.
Simply drag the icon or tab to the taskbar to pin.



Lunes, 20 de febrero de 2012 |

Usuario Invitado [Identificarse](#) | [Quiénes Somos](#) [Sostenibilidad](#) [Contáctenos](#)

[RADIO EN VIVO](#) [Audios](#) | [Videos](#) | [Imágenes](#) | [RSS Noticias](#) | [RSS Audios](#) | [Podcasts](#) | [Chat](#) | [Programas](#)

[Inicio](#) [Radio en Vivo](#) [Nacional](#) [Internacional](#) [Salud](#) [Deportes](#) [Economía](#) [Entretenimiento](#) [Tecnología](#) [Especiales](#)

Inicio

Los trastornos mentales de los padres influirían en conductas suicidas de los hijos

02-17-2012

[Me gusta](#)

[Twitter](#) 0

0



Foto:ingimage

Por: RCN la Radio

Especialistas advierten que muchas conductas suicidas de los hijos están relacionadas con los trastornos mentales de los padres.

Así se desprende de una investigación realizada por el Hospital del Mar en Barcelona, España, donde aseguran que la ansiedad generalizada y depresión de los padres se asocian con la elaboración de planes de suicidio en los hijos.

El psiquiatra de niños y adolescentes, Rafael Vásquez, indicó que la relación depende de cuál de los papás tiene el peso de la crianza y orientación de la familia.

"En el caso de una mamá las funciones de la casa en general se alteran mucho, particularmente las funciones de crianza. Entonces los niños comienzan a ver que su mamá tiene menor disponibilidad para estar con ellos, tiene una interacción y una manera de comportarse que es limitada, porque está sufriendo el drama de la enfermedad y la mayor parte de las funciones de cuidado de los muchachos se altera. Todos estos cambios cuando se vuelven crónicos comienzan a producir en los muchachos una serie de cambios parecidos", explicó el especialista.

Otras de las razones que podría explicar esta influencia es que los hijos hayan heredado las enfermedades mentales de los padres o que no tengan la misma sensibilidad que tienen otros papás para entender las dificultades emocionales de los hijos, porque tienen trastornos mentales.

Finalmente, agregó que si como padre siente algunos de esos sentimientos, lo recomendable es acudir a los expertos, ya que los hijos no tienen más vínculo que el de sus padres.

Tags de este contenido

[Cristina Millan](#) [Salud](#) [RCN Noticias](#) [Destacar](#)

Calificar

[Enviar a un amigo](#)

[Imprimir](#)

[Herramientas Hetah](#)

[SHARE](#) [f](#) [t](#) [e](#) [...](#)

PUBLICIDAD



PUBLICIDAD

Más Servicios

[RCN Mundo](#)

Audio en Vivo

[Facebook](#)

RCN Radio en Facebook

[Twitter RCN Radio](#)

RCN Radio en Twitter

[RCN Chat](#)

Habla con tus amigos

[RSS](#)

Recibe las últimas noticias

[RCN Móvil](#)

Ingresa a nuestro portal de descargas

Copyright RCN Radio © 2010 | [Políticas de privacidad](#)

RED DE PORTALES



Certificado No. SC 5998-1



RADIO CADENA NACIONAL S.A. RCN RADIO - RCN LA RADIO

Bogotá 93.9 FM 770 AM	Apartadó 1310 AM	San Andrés 910 AM
Cali 980 AM	Armenia 1240 AM	San Gil 1220 AM
Medellín 990 AM	Barbosa 1140 AM	Santa Marta 640 AM
Cartagena 1000 AM	Girardot 1290 AM	Sincelejo 1340 AM
B/manga 800 AM	Ibagué 1180 AM	Sogamoso 1200 AM
Cúcuta 940 AM	Montería 1220 AM	Tulúa 1170 AM
Barranquilla 760 AM	Neiva 1150 AM	Tunja 1380 AM
Manizales 1060 AM	Pasto 1340 AM	Valledupar 1260 AM
Pereira 1020 AM	Popayán 1370 AM	Villavicencio 1110 AM

RADIO

RCN Mundo
RCN La Radio
La Mega
La FM
Rumba
Radio 1
Antena 2
Fantástica
La Cariñosa
Amor
El Sol

TELEVISIÓN

Canal RCN MSN
NTN24
Ventas Internacionales
RCN Comerciales
RCN Telenovelas
TV Colombia
Latin America News

SERVICIOS

Aleo Shop
RCN Models
E-nnovva

OTROS

ABC Medicus
Fides
eGamers
Concurso Nacional de Cuento

Designed by: e-nnovva

Instalar Acelerador RCN Radio

□ Noticias >> Internacionales

Twitter 0

Like 1

0

España: Los hijos de padres con ansiedad o depresión tienen más riesgo de suicidio



Imagen de referencia

Los hijos cuyos padres padecen trastornos mentales como ansiedad o depresión tienen más riesgo de suicidio, según ha revelado un estudio internacional realizado en 21 países en el que ha participado el Instituto de Investigación del Hospital del Mar (Imim) de Barcelona.

Elaborado con una muestra de 109.381 personas de los cinco continentes, el estudio ha constatado que los trastornos mentales de los padres se asocian a "una mayor tendencia a la ideación suicida de sus hijos".

Concretamente, la ansiedad generalizada y la depresión se relacionan con la elaboración de planes de suicidio, mientras que la personalidad antisocial y los trastornos de ansiedad de los progenitores se asocian con la realización de intentos de suicidio de los adolescentes.

"Es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental", ha

asegurado el miembro del equipo de investigación español y director del Programa de Epidemiología y Salud Pública Imim, Jordi Alonso, en un comunicado.

Aunque afecta mayoritariamente a personas adultas, el suicidio es la segunda causa de muerte en adolescentes, por lo que Alonso ha destacado la importancia de la prevención para conseguir acabar con este tipo de muerte "evitable".


"Seguiremos estudiando la posible base genética común entre la falta de control de los impulsos y el suicidio", ha añadido Alonso, que ha resaltado que los resultados de esta investigación pueden ser relevantes para guiar otros estudios del mismo ámbito.

Fuente: Europa Press
16/02/2012 10:30 Hs.

Compartir |

tocorre

En Facebook

 Add a comment...

Posting as Hani Saab (Not you?)

Post to Facebook

Facebook social plugin

Comentarios ()

No se Encontraron Comentarios.

Para Publicar Comentarios Registrate Aquí

Publicidad



□ Las noticias más leídas hoy

- 📌 Italia: En Nápoles habilitan estacionamiento... ¡Para hacer sexo en el coche!
16/02/2012
- 📌 Ministros de Lugo vinculados a tierras mal habidas en época de la dictadura
16/02/2012
- 📌 National Geographic capta a tiburón devorando a otro tiburón
16/02/2012
- 📌 "Prefiero el anonimato por temor a represalias"
16/02/2012
- 📌 Estados Unidos: Comía en el restaurante "Ataque al corazón"... ¡Y sufrió un infarto!
16/02/2012

VER MAS

□ Lo más escuchado

- 🔊 Pablo Moscatelli sobre su salida de la empresa Tigo
16/02/2012
- 🔊 Emmanuel Friedman lamenta que lo comparen con Cale Galaverna
16/02/2012
- 🔊 Ministro Paulo Reichardt sobre noticia que lo vincula a tierras mal habidas
16/02/2012
- 🔊 Reinaldo Domínguez Dibb denuncia que MEPSHOW está estafando al estado
16/02/2012
- 🔊 Conrado Pappalardo aclara que ¡jamas en la vida! fue adjudicado con tierras
16/02/2012

VER MAS

□ Quinto Poder

- 🔊 Quinto Poder 10:15 horas
16/02/2012
- 🔊 Quinto Poder 09:50 horas
16/02/2012
- 🔊 Quinto Poder 09:05 horas
16/02/2012
- 🔊 Quinto Poder 08:55 horas
16/02/2012
- 🔊 Quinto Poder 07:40 horas
16/02/2012

VER MAS

□ PodCast

 **Marcelo y el Deporte**
por Marcelo Martín Orue | 2012-02-13

VER MAS

□ Blogs

Diarios de Bicicleta | Canto Gregoriano
por Omarglobal
09/02/2012

Va a necesitar una billetera más grande
Opere con monedas desde su hogar, como un profesional.



Viernes, 17 de febrero de 2012  Madrid 10/2º [Cambiar](#)

[Qué.es en PDF](#)

[Qué.es Móvil](#)

[Qué.es RSS](#)

[Qué.es Widgets](#)

[Portada](#) [Noticias](#) [Deportes](#) [Famosos](#) [Televisión](#) [Tecnología](#) [Curiosas](#) [Ocio](#) [Más](#)

Powered by Google™

[Noticias](#) [Sociedad](#) [España](#) | [Internacional](#) | [Sucesos](#) | [Economía](#) | [Vivienda](#) | [Formación](#) | [Opinión](#) |

[Ciudades](#)

[Llévate un TV LED, cuenta y tarjeta gratis al domiciliar tu nómina](#)

[Fotos](#) [Vídeos](#) [Blogs](#)

Sociedad

[en "laCaixa"](#)

Los hijos de padres depresivos tienen más riesgo de suicidio

CRISTIAN REINO 16 de febrero de 2012

Esta página ha sido vista 124 veces. [Entra](#) para que tus amigos sepan que la has leído.

Be the first of your friends to recommend this.

 0

Los hijos cuyos padres sufren ansiedad o depresión tienen más posibilidades de quitarse la vida en un suicidio. Lo afirma un estudio internacional, realizado en 21 países, y que en Europa lo ha coordinado el Instituto de Investigación (IMIM) del hospital del Mar de Barcelona. "Es fundamental considerar el posible riesgo de conductas suicidas en las familias en las que los padres sufren algún trastorno mental y tener en cuenta que el riesgo aumenta con cada trastorno adicional que padecen los padres", asegura el director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM, Jordi Alonso.

El estudio ha tenido como objetivo determinar qué trastornos mentales de los padres tienen relación con el suicidio de los hijos y cuáles pueden ser más decisivos en el paso de la idea de los jóvenes de matarse a su planificación o intento. Así, según concluye la investigación, "todos los trastornos mentales de los padres tienen que ver con una mayor tendencia a la ideación suicida de los hijos". Pero "sólo la ansiedad generalizada y la depresión se asocian con la elaboración de planes" de los hijos para acabar con su vida. Mientras que la personalidad antisocial de los progenitores influye en la realización de intentos de suicidio de los hijos y con su persistencia en el tiempo.

El trabajo, desarrollado en el marco del World Mental Health, constata que el suicidio es un gran problema de salud pública que, aunque afecta mayoritariamente a personas adultas y de avanzada edad, supone la segunda causa de muerte entre los adolescentes en el mundo occidental. En España, donde desde hace un año el suicidio ha superado a los accidentes de tráfico como segunda causa de muerte (siempre por detrás de las razones naturales), se han disparado las cifras: el número de españoles que se quita la vida ha crecido en un 31% en sólo 10 años.

Aun así, los autores del informe creen que, en parte, es evitable. "La identificación precoz y el tratamiento adecuado de los trastornos mentales son una estrategia preventiva muy importante", señalan. Por ello, los resultados de este trabajo pueden ser relevantes para guiar a los futuros estudios que se lleven a cabo sobre las bases genéticas del suicidio. "Seguiremos estudiando la posible base genética común entre la falta de control de los impulsos y el suicidio", según Alonso.

[Genie QUE!](#) [f Connect](#) [Twitter](#) [ANÓNIMO](#)

Añadir Comentario

Escriba su comentario.

La actualización en tiempo real está **habilitada**.

[\(PAUSAR\)](#)

Mostrando 0 comentarios

Ordenar por: los más recientes primero

[Suscríbete por e-mail](#) [RSS](#)

Proteger sistema embebido

Protección contra ingeniería inversa de software en sist. embebidos.
wibu.com/es/Software-Embebido

Perder peso con Lipo-XR

Descubra la pastilla para perder peso que España ha estado esperando
Lipo-XR.es

El ADSL Mejor Valorado

Descubre el ADSL mejor valorado por los internáutas. Oferta online!
jazztel.com/promocion

Anuncios Google

Suscribirse a Qué.es

26,254 people like this. Be the first of your friends.

5,447 seguidores

Qué.es - Recomendar a un amigo

5% DE DCTO + 3AÑS SIN SUBIDAS!
Al contratar tu seguro por internet

Recent Activity

[facebook](#)

Facebook social plugin